



Moderhinke - Reinfektion: Biosicherheit

Reinfektion/Positiver Befund aufgrund von Tupferproben: Welche Massnahmen sind zu treffen, damit der Moderhinke-Erreger wieder aus meine Herde eliminiert wird?



Stallfremde Personen

- Besucher, Schafscherer, Tierärzte: Schuhe wechseln, Überziehschuhe verwenden oder Desinfektion der Schuhe



Tierzukauf / Austausch von Widdern

Vor der Integration in die Herde:

- Separate Haltung während 4 Wochen
- Klauenbad
- Entnahme von Tupferproben, auch von Einzeltieren



Mind. 3 x Klauenbad im Abstand von 1 Woche

- Standbad 10 Minuten
- Ziegen auch ins Klauenbad stellen



Nach dem Klauenbad

- Auf frische Weide, d.h. seit mind. 4 Wochen keine Beweidung mit fremden Schafen
- oder frisch eingestreute Stallbucht



Achtung

- Saubere Transporter inkl. Rampen
- Nach Klauenbad nicht über gleichen morastigen Triebweg / Auslauf

© Copyright: Der Nachdruck und die Veröffentlichung des Merkblattes, Bildern oder Teilen davon ist nur mit schriftlicher Erlaubnis der Geschäftsstelle und unter Quellenangabe erlaubt.