



Nom commercial	Matière active	Animaux	Administration	Action	Strongles			Douve petite		Douve gde	Délais attente (j)		Remarques
					gastro-intest.	pulmonaires	Adultes	Larve	Adulte		Lait	Vande	
Albex 10%	Albendazole	Bovin, mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X		X	X	5	21	Traitement contre douve à éviter lors période saillie et 1 ^{er} mois de gestation (tétratoène)
Baycox 5%	Toltrazuril	Veau, agneau	oral	immédiate									Veau < 9 mois, contre coccidie <i>E. zuernii</i> et <i>E. bovis</i> ; agneau < 9 mois, contre coccidie <i>E. crandallis</i> et <i>E. ovinoëdalis</i>
Bayticol	Fluméthrine	Bovin	pour-on	rémanente			X				3	0	Gale, poux, tiques
Bovilis Dictol	Larves irradiées	Bovin	oral	vaccin							0	0	2 adm. à 4 sem. d'intervalle, la 1 ^{ère} 6 sem. avant pâture
Butox Protect 7.5 Pour-on	Deltaméthrine	Bovin, mouton	pour-on	rémanente									Contre poux et mouches
Carbesia	Imidocarb	Bovin	injection sc	rémanente							21	213	Contre babésiose
Cestocur	Praziquantel	Mouton	oral	immédiate	X						0	0	Contre vers solitaires <i>Moniezia</i> spp
Chronomintic	Levamisole	Bovin	bolus	continue	X	X	X				NA	140	
Closamectin Pour-on	Closantel + Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X		X	X	NA	28	Infestations mixtes nématodes et grande douve du foie uniquement
Cydectin 0,1%	Moxidectine	Mouton	oral	rémanente	X	X	X				5	7	Strongles pulmonaires adultes uniquement <i>Dicyocaulus filaria</i>
Cydectin 0,5%	Moxidectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X				0	14	Min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Cydectin 2% LA	Moxidectine	Mouton (oreille)	injection sc (oreille)	rémanente	X	X	X				NA	104	Déjà d'attente valable seulement pour injection à l'oreille, ne pas utiliser chez les ovins laitiers
Cydectin 10% LA	Moxidectine	Bovin (oreille)	injection sc (oreille)	rémanente	X	X	X				NA	108	Déjà d'attente valable seulement pour injection à l'oreille/contre varrons, poux, gale/au plus tard 80 j. avant vêlage
Cydectin Triclomox	Moxidectine + Triclabendazole	Mouton	oral	immédiate	X	X	X		X	X	NA	31	Au plus tard 60 j. avant agnelage
Cydectin Triclomox Pour-on	Moxidectine + Triclabendazole	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X		X	X	NA	91	
Dectomax 0,5% Pour-on	Doramectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X				NA	35	Min. 60 j. avant vêlage; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Dectomax injection	Doramectine	Bovin, mouton	injection sc (cou)	rémanente	X	X	X				NA	42	Bovin : min. 28 j. / mouton : min. 70 j. avant mise bas; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Deltanil 10	Deltaméthrine	Bovin, mouton	pour-on	rémanente							0	35	Contre tiques, poux, mouches (bovin)
Endex 8,75%	Triclabendazole + Levamisole	Mouton	oral	immédiate	X	X	X		X	X	7	28	Au plus tard 7 j. avant agnelage; infestations mixtes nématodes et grande douve du foie
Endex 19,5%	Triclabendazole + Levamisole	Bovin	oral	immédiate	X	X	X		X	X	12	28	Au plus tard 7 j. avant vêlage; infestations mixtes nématodes et grande douve du foie
Eprinex Pour-on	Eprinomectine	Bovin, chèvre (uniquement nématodes)	pour-on	rémanente	X	X	X				0	15	Contre varrons, poux, gale, mallophages (bovin), chèvres nématodes uniquement, min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Eprivalan Pour-on	Eprinomectine	Bovin, chèvre (uniquement nématodes)	pour-on	rémanente	X	X	X				0	15	Contre varrons, poux, gale, mallophages (bovin)/15 jours après vaccination Dictol; chèvres nématodes uniquement
Eprizero	Eprinomectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X				0	10	Contre varrons, poux, gale, mallophages, mouches, min. 15 jours après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Halocur	Halofuginone	Veau	oral	immédiate								13	Prévention et traitement contre diarrhée <i>Cryptosporidium parvum</i>
Hapadex 5%	Netobimine	Mouton	oral	immédiate	X	X	X		X	X	5	5 (foie : 20)	Pas pendant 1 ^{er} tiers de gestation



Nom commercial	Matière active	Animaux	Administration	Action	Strongles			Douve petite		Douve gde		Délais attente (j)		Remarques
					gastro-intest.	pulmonaires	Adultes	Larves + adultes	Larves enkystées	Adultes	Larve	Adulte	Lait	
Hapadex 15%	Netobimine	Bovin	oral	immédiate	X	X	X	X	X	X	5	10 (foie: 20)	Douves et vers solitaires: dosage plus élevé; pas pendant 1 ^{er} tiers gestation	
Ivomec injection	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	rémanente	X	X	X	X	X	NA	NA	Bovin: 49 Mouton: 28	Min. 28 j. avant mise bas. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires	
Ivomec plus injection	Ivermectine+Clorsulon	Bovin	injection sc	rémanente	X	X	X	X	X	NA	66	66	Min. 28 j. avant mise bas. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires	
Neoprnil Pour-on	Eprinomectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X	X	X	0	15	15	Min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires	
Noromectin	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	immédiate	X	X	X	X	X	NA	28	28	Au plus tard 28 j. avant mise bas. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires, l'ivermectine n'agit pas contre les douves du foie et les vers solitaires	
Noromectin pour-on	Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X	X	X	NA	28	28	Au plus tard 60 j. avant vêlage, l'ivermectine n'agit pas contre les douves du foie et les vers solitaires	
Optimectin injection	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	rémanente	X	X	X	X	X	NA	28	35	Au plus tard 28 j. avant vêlage. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires, l'ivermectine n'agit pas contre les douves du foie et les vers solitaires	
Optimectin pour-on	Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X	X	X	NA	28	28	Au plus tard 60 j. avant vêlage, l'ivermectine n'agit pas contre les douves du foie et les vers solitaires	
Panacur Boli 250	Fenbendazole	Mouton	oral	immédiate	X	X	X	X	X	6	14 (foie: 21)	14	Traitement simultané contre la douve du foie à éviter	
Panacur SR Bolus	Fenbendazole	Bovin (100 à 300 kg)	bolus	continue	X	X	X	X	X	NA	200	200	Pas génisses portantes, 15 j. après vaccination Dictol	
Panacur suspension 2,5%	Fenbendazole	Mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X	X	X	6	14	14	Traitement simultané contre la douve du foie à éviter	
Panacur suspension 10%	Fenbendazole	Bovin	oral	immédiate	X	X	X	X	X	4	7	7	Traitement simultané contre la douve du foie à éviter	
Sebacil 50%	Phoxime	Bovin, mouton	pulvérisation/lavage	immédiate						NA	30	30	Gale, tiques, poux piqueurs et broyeurs	
Spotinor	Deltaméthrine	Bovin, mouton	pour-on	rémanente						Bovin: 17 Mouton: NA	17	17	Bovin: contre poux, mouches; mouton: contre tiques, poux, poux du mouton, mouches vertes et bleues; agneau: contre tiques et poux	
Systemex interval-bolus	Oxfendazole	Bovin (100 à 250 kg)	bolus	continue	X	X	X	X	X	NA	180	180	5 libérations ponctuelles (23 j.) de la matière active; pas aux gestantes; 15 j. après vaccination Dictol	
Systemex interval-bolus forte	Oxfendazole	Bovin (200 à 400 kg)	bolus	continue	X	X	X	X	X	NA	180	180	+ 500 mg de matière active que le précédent; 15 j. après vaccination Dictol	
Toltrantil 5%	Toltrazuril	Veau, agneau	oral	immédiate						NA	63	63	contre coccidies (traitement/prévention)	
Valbazen 1,9%	Albendazole	Mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X	X	X	5	12	12	Valbazen 1,9%/10%/bolus: ne pas traiter en phase aiguë d'infection de grande douve/ne pas utiliser lors de période de saillie et 1 ^{er} mois de gestation / durant le 1 ^{er} mois de gestation contre les douves	
Valbazen 10%	Albendazole	Bovin	oral	immédiate	X	X	X	X	X	5	12	12	Contre coccidies <i>Eimeria</i> spp	
Vecoxan	Diclazuril	Veau, agneau	oral	immédiate							0	0		
Virbamec	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	rémanente	X	X	X	X	X	NA	28	28	Min. 28 jours avant mise bas; varrons, gale, poux, mouches, PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire	
Zolvix	Monepantel	Mouton	oral	immédiate	X	X	X	X	X	NA	7	7		

Légende: **NA** = non admis; **SC** = sous cutané; **Ecto** = parasites externes. Source: Tierarzneimittelkompendium mai 2019