



Nom commercial	Matière active	Animaux	Administration	Action	Strongyles			Douve petite	Douve		Délais attente (j)		Remarques
					gastro-intest.	pulmonaires	Adultes		Larve	Adulte	Lait	Vande	
Albex 10%	Albendazole	Bovin, mouton, chèvre	oral	immédiate	x	x	x		x	bovin: 7 mouton, chèvre: 21		Traitement à éviter lors de période saillie et 1er mois de gestation (tétralogène)	
Baycox 5%	Toltrazuril	Veau, agneau	oral	immédiate						Veau: 63 Agneau: 42		Veau < 9 mois, contre coccidie E. zuernii et E. bovis, agneau < 9 mois, contre coccidie E. crandallis et E. ovinoidalis	
Bayticol	Fluméthrine	Bovin	pour-on	rémanente						3	0	Gale, poux, tiques	
Bovilis Dictol	Larves irradiées	Bovin	oral	vaccin	x	x				0	0	2 adm. à 4 sem. d'intervalle, la 1ère 6 sem. avant pâture	
Butox Protect 7.5 Pour-on	Deltaméthrine	Bovin, mouton	pour-on	rémanente						bovin: 0 mouton: 0.5	18 Mouton: 1	Contre poux et mouches	
Carbesia	Imidocarb	Bovin	injection sc	rémanente						21	213	Contre babésiose. Pas d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire	
Cestocur	Praziquantel	Mouton	oral	immédiate	x	x				0	0	Contre vers solitaires Moniezia spp	
Chronomic	Levamisole	Bovin	bolus	continue	x	x				NA	140		
Closamectin Pour-on	Closantel + Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	x	x			x	NA	28	Infestations mixtes nématodes et grande douve du foie uniquement	
Cydectin 0,1%	Moxidectine	Mouton	oral	rémanente	x	x				5	7	Strongyles pulmonaires adultes uniquement Dictyocaulus filaria	
Cydectin 0,5%	Moxidectine	Bovin	pour-on	rémanente	x	x				0	14	Min. 14 j. après 2e vaccin contre les strongyles pulmonaires	
Cydectin 2% LA	Moxidectine	Mouton (oreille)	injection sc (oreille)	rémanente	x	x				NA	104	Délai d'attente valable seulement pour injection à la base de l'oreille, ne pas utiliser chez les ovins laitiers	
Cydectin 10% LA	Moxidectine	Bovin (oreille)	injection sc (oreille)	rémanente	x	x				NA	108	Délai d'attente valable seulement pour injection à l'oreille/ contre varrons, poux, gale/ au plus tard 80 j. avant vêlage	
Dectomax 0,5% Pour-on	Doramectine	Bovin	pour-on	rémanente	x	x				NA	35	Min. 60 j. avant vêlage; min. 14 j. après 2e vaccin contre les strongyles pulmonaires	
Dectomax injection	Doramectine	Bovin, mouton	injection sc (cou)	rémanente	x	x				NA	70 Mouton: 70	Bovin: min. 28 j. / mouton: min. 70 j. avant mise bas; min. 14 j. après 2e vaccin contre les strongyles pulmonaires	
Deltanil 10	Deltaméthrine	Bovin, mouton	pour-on	rémanente					x	0	35	Contre tiques, poux, mouches (bovin)	
Endex 8,75%	Triclabendazole + Levamisole	Mouton	oral	immédiate	x	x			x	NA	28	Infestations mixtes nématodes et grande douve du foie	
Endex 19,5%	Triclabendazole + Levamisole	Bovin	oral	immédiate	x	x			x	NA	28	Infestations mixtes nématodes et grande douve du foie	
Eprinex Multi 5 mg/ml ad us.	Eprinomectine	Bovin, mouton, chèvre	injection sc	rémanente	x	x				Bovin: 15 Mouton: 2 chèvre: 1		Contre varrons, poux, gale, mallophage (bovin), chèvres et moutons contre strongyles gastro-intestinaux et pulmonaires uniquement	
Eprinex Pour-on	Eprinomectine	Bovin, chèvre (uniquement nématodes)	pour-on	rémanente	x	x				0	15	Contre varrons, poux, gale, mallophages (bovin), chèvres nématodes uniquement, min. 14 j. après 2e vaccin contre les strongyles pulmonaires	
Eprivalan Pour-on	Eprinomectine	Bovin, chèvre (uniquement nématodes)	pour-on	rémanente	x	x				0	15	Contre varrons, poux, gale, mallophages (bovin)/14 jours après vaccination Dictol; chèvres nématodes uniquement	



Nom commercial	Matière active	Animaux	Administration	Action	Strongles			Douve petite		Douve		Délais attente (j)	Ecto	Remarques
					gastro-intest.	pulmonaires	Adultes	Larves enkystées	Larves + adultes	Larve	Adulte			
Eprizero	Eprinomectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X	X			0	10	X	Contre varrons, poux, gale, mallophages, mouches, min. 14 jours après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Halocur	Halofuginone	Veau	oral	immédiate							13			Prévention et traitement contre diarrhée Cryptosporidium parvum
Neopriniil Pour-on	Eprinomectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X	X			0	15	X	Min. 14 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Noromectin	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	immédiate	X	X	X	X			NA	Bovin : 28 Mouton : 42	X	Au plus tard 28 j. avant mise bas. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire ; min. 14 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires, l'ivermectine n'agit pas contre les douves du foie et les vers solitaires
Noromectin pour-on	Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X	X			NA	28	X	Au plus tard 60 j. avant vêlage, l'ivermectine n'agit pas contre les douves du foie et les vers solitaires
Optimectin pour-on	Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X	X			NA	28	X	Au plus tard 60 j. avant vêlage, l'ivermectine n'agit pas contre les douves du foie et les vers solitaires
Panacur Boli 250	Fenbendazole	Mouton	oral	immédiate	X	X	X	X			6	14 (foie : 21)		Traitement simultané contre la douve du foie à éviter
Panacur SR Bolus	Fenbendazole	Bovin (100 à 300 kg)	bolus	continue	X	X	X	X			NA	200		Pas génisses portantes, 14 j. après vaccination Dictol
Panacur suspension 2,5 %	Fenbendazole	Mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X	X			6	14		Traitement simultané contre la douve du foie à éviter
Panacur suspension 10 %	Fenbendazole	Bovin	oral	immédiate	X	X	X	X			4	7		Traitement simultané contre la douve du foie à éviter
Sebacil 50 %	Phoxime	Bovin, mouton	pulvérisation/lavage	immédiate							NA	Bovin : 30 Mouton : 42	X	Gale, tiques, poux piqueurs et broyeurs
Spotinor	Deltaméthrine	Bovin, mouton	pour-on	rémanente							Bovin : 0 Mouton : NA	Bovin : 17 Mouton : 35	X	Bovin : contre poux, mouches ; mouton : contre tiques, poux, poux du mouton, mouches vertes et bleues ; agneau : contre tiques et poux
Systemex interval-bolus	Oxfendazole	Bovin (100 à 250 kg)	bolus	continue	X	X	X	X			NA	180		5 libérations ponctuelles (23 j) de la matière active ; pas aux gestantes, après la 2 ^e vaccination au Dictol
Systemex interval-bolus forte	Oxfendazole	Bovin (200 à 400 kg)	bolus	continue	X	X	X	X			NA	180		+ 500 mg de matière active que le précédent ; après la 2 ^e vaccination au Dictol
Toltraniil 5 %	Toltrazuril	Veau, agneau	oral	immédiate							NA	veau : 63 agneau : 42		Contre coccidies (traitement/prévention)
Valbazen 1,9 %	Albendazole	Mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X	X		X	5	12		Valbazen 1,9 %/10%/bolus : ne pas traiter en phase aiguë d'infection de grande douve/ne pas utiliser lors de période de saillie et 1 ^{er} mois de gestation / durant le 1 ^{er} mois de gestation contre les douves
Valbazen 10 %	Albendazole	Bovin	oral	immédiate	X	X	X	X		X	3,5	7		
Vecoxan	Diclazuril	Veau, agneau	oral	immédiate								0		Contre coccidies <i>Eimeria</i> spp
Virbamec	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	rémanente	X	X	X	X			NA	Bovin : 28 Mouton : 42	X	Min. 28 jours avant mise bas ; varrons, gale, poux, mouches, PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire
Zolvix	Monepantel	Mouton	oral	immédiate	X	X	X	X			NA	7		

Légende : **NA** = non admis ; **SC** = sous cutané ; **Ecto** = parasites externes. Source : Tierarzneimittelkompendium Sept produits ne sont plus autorisés depuis 2019 en Suisse : Cydectin Triclimox et Pour-on, Hapadex 5% et 15%, Ivomec injection et plus injection, Optimectin injection