



Liste des variétés de betteraves fourragères pour la récolte 2019

| Variétés | Type | Rendement en MS | Vigueur au départ | Aptitude à la récolte | | | Terre adhérente | Résistance à la cerco-sporiose | Couleur de l'enrobage | |
|-----------|------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | Arracheuse par les feuilles | Récolteuse totale | Manuelle | | | | |
| Brigadier | | | + | ++ | -- | -- | +++ | Très faible | +++ | Orange |

Betteraves fourragères (9 à 13% MS)

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|----|----|----|-----|-------------|-----|--------|
| Brigadier | | + | ++ | -- | -- | +++ | Très faible | +++ | Orange |
|-----------|--|---|----|----|----|-----|-------------|-----|--------|

Betteraves fourragères demi-sucrières (13 à 16% MS)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|--------|
| Geronimo | RR | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | Très faible | +++ | Jaune |
| Jamon ¹ | | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | Très faible | Ø | Orange |
| Kyros | | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | Faible | ++ | Jaune |
| Lipari | RR | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | Faible | +++ | Rouge |
| Ribambelle | RR | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | Très faible | +++ | Rouge |
| Starmon | RR | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | Moyenne | ++ | Jaune |

Betteraves fourragères sucrières (plus de 16% MS)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----|-----|----|-----|----|-------------|----|---------|
| Godiva ² | RR | +++ | +++ | ++ | +++ | -- | Très faible | ++ | Blanche |
| Debby | RR | +++ | +++ | + | +++ | -- | Moyenne | ++ | Blanche |
| Enermax | RR | +++ | ++ | ++ | +++ | - | Elevée | ++ | Blanche |
| Magnum | | +++ | ++ | ++ | +++ | -- | Elevée | + | Blanche |

Source: commerce de semences

Semences du commerce :

¹ Monogerme, enrobée, non traitée ; Bio niveau 2

² Variété résistante au rhizoctone brun

Légende

+++ Très bon

Ø Moyen

RR **Variétés résistantes à la rhizomanie** recommandées si plus de 10% de la parcelle est contaminé ou dans les zones à risque selon le Centre betteravier suisse.

++ Bon

- Moyen à faible

+ Moyen à bon

-- faible



Quantité de semence par hectare selon l'espacement choisi et l'interligne

| | Interligne 44 cm | | | Interligne 50 cm | | |
|-------------------------------------|------------------|------|-----|------------------|-----|-----|
| | 9 | 13,5 | 20* | 8 | 12 | 18* |
| Espacement sur la ligne (cm) | 9 | 13,5 | 20* | 8 | 12 | 18* |
| Nombre de paquets/ha | 5 | 3,4 | 2,2 | 5 | 3,4 | 2,2 |
| 1 paquet = 50 000 graines | | | | | | |
| Surface semée (are) par paquet | 20 | 30 | 45 | 20 | 30 | 45 |

* Semis en place.

Peuplement

| Plantes par ha | Nombre de plantes saines à trouver sur 10 m de ligne selon écartement des lignes | |
|-------------------------|---|-----------|
| | 44 cm | 50 cm |
| 60 000 | 27 | 30 |
| 70 000 | 31 | 35 |
| 80 000 → Optimum | 36 | 40 |
| 90 000 | 40 | 45 |
| 100 000 | 44 | 50 |

Ne compter que les plantes saines que l'on peut laisser après éclaircissement.

Faut-il remplacer la culture ?

| Période | Limite de peuplement plantes/ha | Nombre de plantes saines à trouver sur 10 m de ligne selon écartement des lignes | |
|-----------|------------------------------------|--|-------|
| | | 44 cm | 50 cm |
| Fin avril | 44 000 | 20 | 22 |
| Début mai | 40 000 | 18 | 20 |
| Début mai | 36 000 | 16 | 18 |

Date limite de ressemis: 20 mai.

Conseil: semer dans de bonnes conditions avant le 20 mai: meilleure récolte que culture souffrant en été en raison d'une mauvaise structure du sol.