



Méthodes culturales recommandées

- Surveiller très attentivement les cultures de tabac situées dans les lieux humides, bas-fonds, lisières et bords de haies.
- Respecter l'équilibre de la fumure (attention aux excès d'azote) afin de ne pas trop retarder la maturité.
- Cueillir les feuilles basses suffisamment tôt et enlever les feuilles de terre qui sont souvent les premières atteintes par le mildiou.
- Détruire et enfouir les restes de plantes sitôt la dernière récolte terminée.
- En fin de saison, éliminer rapidement tous les déchets de tabac qui traînent dans les séchoirs et dans les environs immédiats.

Stratégie de lutte préventive

- Alternier les matières actives pour éviter la formation de souches résistantes.
- Traiter préventivement tous les 14 jours à partir de la plantation en champ, quel que soit le développement de la culture.
- Renouveler le traitement après des précipitations (> 20 – 25 mm) ou une irrigation correspondante.
- Espacer les traitements après la récolte des feuilles basses.
- En période de récolte, traiter par secteur pour respecter les délais d'attente et pour éviter les risques de résidus.
- Laisser des passages pour effectuer ces traitements, ou au besoin, en créer.

Choix des produits

Se conformer aux **directives annuelles pour la protection phytosanitaire du tabac**, dans le respect des exigences relatives aux limites maximales de résidus (LMR).

Obligation d'annonce

En cas de découverte de foyers de mildiou, avertir aussitôt le service phytosanitaire cantonal ou le service de vulgarisation tabacole, ainsi que son association régionale.

Groupes de résistance (FRAC)	Mildiou	Sclérotiniose	Oïdium	MATIERE ACTIVE Produit commercial Firme	Dosage (l/ha)	Nbr d'application max. par année	Délais d'attente en semaines*	Protection utilisateur	Protection environnement	Prix CHF/ha
40	4			DIMETOMORPHE Forum (Ba)	1,5	2	3	Ⓢ	🐟	66
21	4			CYAZOFAMIDE Ranman Top (LG, Sy)	0,5	3	2	Ⓢ	<6> 🐟	50
40	4			MANDIPROPAMIDE Revus (LG, Sa, Sy)	0,5	2	10 jours		🐟	38
11 + 7		4		TRIFLOXYSTROBINE + FLUOPYRAM Moon Sensation (Ba)	0,8	3	2		🐟	225
3			4	PENCONAZOLE Topas (Sy)	0,2	3	2	Ⓢ	🐟	20
3			4	PENCONAZOLE Topas Vino (Sy)	0,375	3	2		🐟	35

* Délai d'attente recommandé par la profession