



Insecticides pour pulvérisation

| GROUPE INSECTICIDES | GROUPE DE RÉSISTANCE | Efficacité | MATIÈRE ACTIVE Produit commercial Firme | Dose de produit commercial, l ou kg/ha | | | Nombre d'applications maximales par année | Délai d'attente en semaines | Protection utilisateur | Protection environnement | Toxicité Auxiliaires | Prix arrondi CHF/ha |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Noctuelles terricoles Vers gris | Noctuelles défoliatrices | Pucerons | | | | | | |
| N | 4A | 4 | ACÉTAMIPRIDE Gazelle SG (St), Oryx Pro (Sy), Pistol (Om) | | | 0.25 | 2 | 2 * | | (1 pt) | 4 | 33 - 36 |
| P | 3A | 4 | ALPHA-CYPERMÉTHRINE Fastac Perlen (BF)** | 0.07 | | | 1 | 6 | (A) | <100> (1 pt) | 5 | 7 |
| BT ¹ | 11A | 3 | BACILLUS THURINGIENSIS Dipel DF (Om) | | 0.75 | | | 3 jours | | | 1 | 75 |
| BT ¹ | 11A | 3 | BACILLUS THURINGIENSIS Xen Tari WG (LG) | | 1.0 | | | 3 jours* | | | 1 | 100 |
| P | 3A | 4 | CYPERMETHRINE Cypermethrine (Sa) | 0.25 | | | 1 | 6* | (V)(M) | <100>, (1pt) | 5 | 5 |
| PC | 29 | 4 | FLONICAMIDE Teppeki (Om) | | | 0.14 | 2 | 10 jours* | (V) | | 1 | 83 |
| P | 3A | 4 | LAMBDA-CYHALOTHRINE Karaté Zéon (Sa, Sy) | 0.075 à 0.15 | | | 1 | 6 | (V)(M)(A) | <20> | 5 | 9 - 18 |
| | | | Ravane 50 (Sc) | | | | | | | | | |
| | | | TAK 50 EG (St)*** | | | | | | | | | |
| | | | Techno 10 CS (LG) | | | | | | (A) | | | |

¹ Traiter le soir, lorsque les chenilles sont actives. Meilleure efficacité sur jeunes larves. Sur des larves âgées ou si dégâts localisés, utiliser des appâts insecticides

* Délai d'attente recommandé par la profession.

** Délai d'utilisation : 30.6.2023

*** Délai d'utilisation : 15.7.2023