



Nom commercial	Matière active	Animaux	Administration	Action	Strongles gastro-pulmonaires			Douve petite	Douve grande		Délais attente (j)		Remarques
					Larves + adultes	Larves enkystées	Adultes		Larve	Adulte	Lait	Viande	
Albex 10 %	Albendazole	Bovin, mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X		X	5	21	Traitement contre douve à éviter lors période saillie et 1 ^{er} mois de gestation (tératogène)	
Baycox 5 %	Toltrazuril	Veau, agneau	oral	immédiate							Veau : 63 Agneau : 42	Veau < 9 mois, contre coccidie <i>E. zuernii</i> et <i>E. bovis</i> ; agneau < 9 mois, contre coccidie <i>E. crandallis</i> et <i>E. ovinoidalis</i>	
Bayticol	Fluméthrine	Bovin	pour-on	rémanente						3	0	Gale, poux, tiques	
Bovilis Dictol	Larves irradiées	Bovin	oral	vaccin						0	0	2 adm. à 4 sem. d'intervalle, la 1 ^{ère} 6 sem. avant pâture	
Butox Protect 7.5 Pour-on	Deltaméthrine	bovin, mouton	pour-on	rémanent						B: 0 M: 0,5	18 Mouton: 1	Contre poux et mouches	
Carbesia	Imidocarb	Bovin	injection sc	rémanente	X					21	213	Contre babésiose	
Cestocur	Praziquantel	Mouton	oral	immédiate	X					0	0	Contre vers solitaires <i>Moniezia ssp</i>	
Chronomintic	Levamisole	Bovin	bolus	continue	X	X				NA	140		
Closamectin injection	Closantel + Ivermectine	Bovin	injection sc	rémanente	X	X			X	NA	49	infestations mixtes nématodes et grande douve du foie uniquement	
Closamectin Pour-on	Closantel + Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X			X	NA	28	infestations mixtes nématodes et grande douve du foie uniquement	
Cydectin 0,1 %	Moxidectine	Mouton	oral	rémanente	X	X				5	7	Strongles pulmonaires adultes uniquement	
Cydectin 0,5 %	Moxidectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X				0	14	Min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires	
Cydectin 2 % LA	Moxidectine	Mouton	injection sc	rémanente	X	X				NA	104	Délai d'attente valable seulement pour injection à l'oreille, ne pas utiliser chez les ovins laitiers	
Cydectin 10 % LA	Moxidectine	Bovin	injection sc	rémanente	X	X				NA	108	Délai d'attente valable seulement pour injection à l'oreille/contre varrons, poux, gale/au plus tard 80 j. avant vêlage	
Cydectin Triclomox	Moxidectine + Triclabendazole	Mouton	oral	immédiate	X	X			X	NA	31	Au plus tard 60 j. avant agnelage	
Cydectin Triclomox Pour-on	Moxidectine + Triclabendazole	Bovin	pour-on	rémanente	X	X			X	NA	91		
Dectomax 0,5 % Pour-on	Doramectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X				NA	35	Min. 60 j. avant vêlage; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires	
Dectomax injection	Doramectine	Bovin, mouton	injection sc (cou)	rémanente	X	X				NA	42 Mouton : 35	Bovin: min. 28 j. / mouton: min. 70 j. avant mise bas ; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires	
Deltanil 10	Deltaméthrine	Bovin, mouton	pour-on	rémanente						0	17 Mouton : 35	Contre tiques, poux, mouches (bovin)	
Endex 8,75 %	Triclabendazole + Levamisole	Mouton	oral	immédiate	X	X			X	7	28	Au plus tard 7 j. avant agnelage; infestations mixtes nématodes et grande douve du foie	
Endex 19,5 %	Triclabendazole + Levamisole	Bovin	oral	immédiate	X	X			X	12	28	Au plus tard 7 j. avant vêlage; infestations mixtes nématodes et grande douve du foie	
Eprinex Pour-on	Eprinomectine	Bovin, chèvre (uniquement nématodes)	pour-on	rémanente	X	X				0	15	Contre varrons, poux, gale, min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires	
Eprivalan Pour-on	Eprinomectine	Bovin, chèvre (uniquement nématodes)	pour-on	rémanente	X	X				0	15	Contre varrons, poux, gale/15 jours après vaccination Dictol	



Nom commercial	Matière active	Animaux	Administration	Action	Strongles gastro-pulmonaires			Douve grde		Délais attente (j)		Remarques
					Larves + adultes	Larves enkystées	Adultes	Larve	Adulte	Lait	Viande	
Halocur	Halofuginone	Veau	oral	immédiate							13	Prévention et traitement contre diarrhée <i>Cryptosporidium parvum</i>
Hapadex 5 %	Netobimime	Mouton	oral	immédiate	X	X	X	X	X	5	5 (foie : 20)	Pas pendant 1 ^{er} tiers de gestation
Hapadex 15 %	Netobimime	Bovin	oral	immédiate	X	X	X	X	X	5	10 (foie : 20)	Douves : dosage plus élevé ; pas pendant 1 ^{er} tiers gestation
Ivomec injection	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	rémanente	X	X	X			NA	Bovin : 49 Mouton : 28	Min. 28 j. avant mise bas. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire ; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Ivomec plus injection	Ivermectine + Cloisulon	Bovin	injection sc	rémanente	X	X	X	X	X	NA	66	Min. 28 j. avant mise bas. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire ; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Neoprnil Pour-on	Eprinomectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X			0	15	Min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Noromectin	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	immédiate	X	X	X			NA	Bovin : 28 Mouton : 42	Au plus tard 28 j. avant mise bas. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire ; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Noromectin pour-on	Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X			NA	28	Au plus tard 60 j. avant vêlage
Optimectin injection	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	rémanente	X	X	X			NA	Bovin : 28 Mouton : 35	Au plus tard 28 j. avant vêlage. PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire ; min. 15 j. après 2 ^e vaccin contre les strongles pulmonaires
Optimectin pour-on	Ivermectine	Bovin	pour-on	rémanente	X	X	X			NA	28	Au plus tard 60 j. avant vêlage
Panacur Boli 250	Fenbendazole	Bovin Mouton	pour-on oral	immédiate	X	X	X			6	14 (foie : 21)	Traitement simultané contre la douve du foie à éviter
Panacur SR Bolus	Fenbendazole	Bovin	bolus	continue	X	X	X			NA	200	100 kg < bovins < 300 kg, pas génisses portantes, 15 j. après vaccination Dictol
Panacur suspension 2,5 %	Fenbendazole	Mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X			6	14	Traitement simultané contre la douve du foie à éviter
Panacur suspension 10 %	Fenbendazole	Bovin	oral	immédiate	X	X	X			4	7	Traitement simultané contre la douve du foie à éviter
Sebacil 50 %	Phoxime	Bovin, mouton	pulvérisation/lavage	immédiate						NA	Bovin : 30 Mouton : 42	Gale, tiques, poux piqueurs et broyeurs
Systemex interval-bolus	Oxfendazole	Bovin (100 à 250 kg)	bolus	continue	X	X	X			NA	180	5 libérations ponctuelles (23 j.) de la matière active ; pas aux gestantes ; 15 j. après vaccination Dictol
Systemex interval-bolus forte	Oxfendazole	Bovin (200 à 400 kg)	bolus	continue	X	X	X			NA	180	+ 500 mg de matière active que le précédent ; 15 j. après vaccination Dictol
Toltraniil 5 %	Toltrazuril	Veau, agneau	oral	immédiat						NA	Veau : 63 Agneau : 42	Contre coccidies (traitement/en prévention)
Valbazen 1,9 %	Albendazole	Mouton, chèvre	oral	immédiate	X	X	X	X	X	5	12	Valbazen 1,9 %/10 %/bolus : ne pas traiter en phase aiguë d'infection de grande douve/ne pas utiliser lors de période de saillie et 1 ^{er} mois de gestation / durant le 1 ^{er} mois de gestation contre les douves
Valbazen 10 %	Albendazole	Bovin	oral	immédiate	X	X	X	X	X	5	12	
Vecoxan	Diclazuril	Veau, agneau	oral	immédiate							0	Contre coccidies <i>Eimeria</i> spp
Virbamec	Ivermectine	Bovin, mouton	injection sc	rémanente	X	X	X			NA	Bovin : 28 Mouton : 42	Min. 28 jours avant mise bas ; varrons, gale, poux, mouches, PAS d'utilisation intraveineuse ou intramusculaire
Zolvix	Monepantel	Mouton	oral	immédiate	X	X	X			NA	7	

Légende : **NA** = non admis **SC** = sous cutané **Ecto** = parasites externes

Source : « Tierarzneimittelkompendium » mai 2016